

ШКАЛА ГЛАЗОМЕРНОЙ ОЦЕНКИ ВЕСЕННЕГО РАЗВИТИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ (ПОЧКИ, ПОБЕГИ, ЛИСТЬЯ) У БЕРЁЗЫ ПУШИСТОЙ

БАЛЛ	ОПИСАНИЕ
0	<p>Зимний покой – отсутствие видимых изменений в почках.</p> <p>Наблюдаемая картина: ВСЕ почки сохраняют зимний вид и размеры.</p>
1	<p>Набухание почек – появление набухших листовых (вегетативных) почек, у которых разошлись наружные почечные чешуи; увеличившаяся в размерах почка прикрыта полупрозрачным плёнчатым «чехликом» из внутренних почечных чешуй.</p> <p>Варианты наблюдаемого:</p> <ul style="list-style-type: none"> от первых слегка набухших почек; до всех предельно увеличившихся в размерах почек, «одетых» в полупрозрачные плёнчатые «чехлики» из внутренних почечных чешуй; но на ветвях ещё нет «лопнувших» почек с показавшимися кончиками листьев.
2	<p>«Разверзание» или «проклёвывание» почек – появление «лопнувших» почек с показавшимися между почечными чешуями кончиками зелёных листьев, которые ещё сложены в плотный пучок и прижаты друг к другу.</p> <p>Варианты наблюдаемого:</p> <ul style="list-style-type: none"> от первых почек с показавшимися зелёными кончиками листьев; до практически всех «проклюнувшихся» почек; но показавшиеся листья во всех почках ещё сложены в плотные пучки и не расходятся.
3	<p>Начало «зеленения», начало распускания листьев – появление «расхохлившихся» почек, в которых растущие листья ещё плотно сложены и собраны в пучки, но постепенно отходят друг от друга, разворачиваются, выглядывают из почек «раскрытыми клювиками».</p> <p>Варианты наблюдаемого:</p> <ul style="list-style-type: none"> от первых почек с расходящимися и разворачивающимися листьями (издали дерево в неясной зелёной «дымке»); до «расхохливания» всех почек, листья в которых достаточно разошлись в стороны (издали дерево в ясной зелёной «дымке»); но полностью обособленных листьев ещё нет.
4	<p>«Зеленение», распускание листьев – появление вполне обособленных маленьких листьев с сильно гофрированной листовой пластинкой, черешки ещё не видны, дерево зазеленело.</p> <p>Варианты наблюдаемого:</p> <ul style="list-style-type: none"> от первых полностью обособленных листьев в «расхохлившихся» почках; до массового обособления листьев в «расхохлившихся» почках; но черешки у листьев ещё не видны, листовые пластинки сильно гофрированы; издали дерево ясно зазеленело.
5	<p>«Облиствение», появление полностью расправившихся листьев - появление маленьких вполне обособленных листьев, у которых стали хорошо заметны черешки; листовые пластинки из гофрированных становятся слегка волнистыми.</p> <p>Варианты наблюдаемого:</p> <ul style="list-style-type: none"> от первых маленьких листьев с гофрированной листовой пластинкой и заметными черешками; до массового появления подросших листьев с развитыми черешками, листовые пластинки которых стали слегка волнистыми; пучки сложенных листьев видны лишь на концах побегов; но рост молодых побегов ещё не заметен.
6	<p>Рост молодых побегов - стали заметны растущие молодые зелёные побеги, на которых, по мере их роста, происходит постепенное распускание листьев.</p> <p>Варианты наблюдаемого:</p> <ul style="list-style-type: none"> от первых молодых побегов, рост которых стал хорошо заметен; до массового роста побегов; но листья на старых побегах ещё слегка волнистые и такие же ярко зелёные, как и на молодых растущих побегах.
7	<p>Начало летней вегетации - листья практически полностью расправились и разгладились, достигли нормальной величины, приобрели более тёмную зелёную окраску, стали более жёсткими.</p> <p>Варианты наблюдаемого:</p> <ul style="list-style-type: none"> от незначительной части листьев, приобретших летнюю форму, размеры, окраску и жёсткость до перехода всей кроны берёзы в состояние летней вегетации; молодые побеги на ветвях берёзы продолжают расти, на них распускаются новые листья, которые отличаются от остальных более светлой зелёной окраской.

