

АН: +*Пю* – 4 (басс. р. Тойсук – Прудникова, Чепинога, 2007); *Сб* – 8 (хр. Хамар-Дабан). **ПР:** +*Пв* – 11 (оз. Очаул – Водопьянова, 1978), 12 (Байк.-Лен. заповед. – Гербарий Б-ЛГЗ); +*Пс* – 13 (сел. Ербогачен – Водопьянова, 1984), 14 (р. Черепаниха – Водопьянова, 1978); +*Нс* – 18 (верх. р. Прав. Сыгыкта (хр. Кодар) – Чечеткина, Малышев, 2005). – **2n = 16** (Фризен, 1986).

577. +**A. gubanovii** Kamelin, 1980, Бюл. Моск. общ. испыт. прир., отд. биол. 85, 5: 83. – *A. amphibolum* auct. Fl. Sib. Centr., non Ledeb., p. p. – **Л. Губанова**.

+**ПР:** +*Нб* – 15 (Байк.-Лен. заповед. – Степанцова, 2001а); +*Нс* – 18 (кордон Амалык – IRKU). – **2n = 32** (Фризен, 1991а).

Примечание. К этому виду относятся растения Сев. Прибайкалья и гор Станового нагорья, определявшиеся ранее как *A. amphibolum*.

578. **A. malyshevii** N. V. Friesen, 1987, Фл. Сиб., 4: 89. – *A. amphibolum* auct. Fl. Sib. Centr., non Ledeb., p. p. – **Л. Малышева**.

АН: *Сб* – 8; *Сс* – 9, 10. – **2n = 16** (Беляева, Сипливинский, 1977, как *A. amphibolum*; Фризен, 1991а).

Примечание. К этому виду относятся растения Саян и гор Юж. Прибайкалья, определявшиеся ранее как *A. amphibolum* Ledeb. Собственно *A. amphibolum* встречается в Тыве и на Алтае. Во Фл. Сиб. (1987: 89) после русскоязычного текста протолога ошибочно указано $2n = 26$.

579. **A. maximowiczii** Regel, 1875, Acta Horti Petropol. 3, 2: 153. – **Л. Максимовича**.

ПР: +*Нс* – 18 (Чечеткина, Малышев, 2005); *Нн* – 19 (р. Витим – Фл. Сиб., 1987). – **2n = 16** (Фризен, 1985).

580. **A. microdictyon** Prokh. 1930, Тр. прикл. бот., генет., селек. 24, 2: 174. – *A. victorialis* auct. non L. – **Л. Черемша**.

АН: *Пз* – 1, 2, 3; *Пю* – 4, 5, 6; *Сб* – 7, 8; *Сс* – 9, 10. **ПР:** *Пв* – 12 (сел. Конец-Луг – Фл. Сиб., 1987; Байк.-Лен. заповед. – Частухина, Степанцова, 2001; сел. Казачинское – IRKU; сел. Чанчур – Н. Степанцова, ориг. свед.); *Пс* – 14 (г. Киренск – Фл. Сиб., 1987); +*Нб* – 15 (окр. пер. Солнцепадь (верх. р. Лена), мыс Елохин – Частухина, Степанцова, 2001). – **2n = 16** (Беляева, Сипливинский, 1975; Крогулевич, 1976, 1978; Фризен, 1985, 1991а).

581. +**A. monadelpum** Less. ex Kunth, 1843, Enum. Pl. 4: 393. – **Л. односторонний**.

+**АН:** +*Сб* – 8 (Л. Малышев, ориг. свед.; р. Бабха – IRKU); +*Сс* – 9 (Агульские белки г. Дода – Малышев, 1965: 99). +**ПР:** +*Нб* – 15 (Байк.-Лен. заповед. – Степанцова, 2001а); +*Нс* – 18 (р. Мельчикит – Чечеткина, Малышев, 2005). – **2n = 16** (Фризен, 1985, 1991а).

582. **A. montibaicalense** N. V. Friesen, 1992, in Hanelt et al., The Genus Allium Taxon. Probl. (Gatersleben): 66; Доронькин, 2003, Фл. Сиб. 14: 34. – **Л. горнобайкальский**.

ПР: *Нб* – 15 (исток р. Мужинай – Доронькин, 2003).

Примечание. Вид описан из Иркутской обл. (исток р. Мужинай).

583. **A. obliquum** L. 1753, Sp. Pl.: 296; Доронькин, 2003, Фл. Сиб. 14: 34. – **Л. косой**.

АН: *Пю* – 5 (окр. г. Иркутск – Виньковская, Барицкая, 1997). – Культ. и адв.

584. +**A. prostratum** Trevir. 1822, Index Sem. Horti Wratisl.: 16. – **Л. стелющийся**.

+**АН:** +*Сб* – 7 (склон м/у падыми Мал. и Бол. Кадильные – NSK). +**ПР:** +*Нб* – 15 (Байк.-Лен. заповед. – Степанцова, 1998а, 1998б, 2001а). – **2n = 16** (Фризен, 1983).

585. **A. ramosum** L. 1753, Sp. Pl.: 296. – *A. odorum* L. – **Л. ветвистый**.

АН: *Пз* – 1, 2; *Пю* – 4, 5, 6; *Сб* – 7, 8. **ПР:** *Пв* – 11, 12; *Нб* – 15. – **2n = 32** (Фризен, 1985).

586. **A. schoenoprasum** L. 1753, Sp. Pl.: 301. – *A. sibiricum* L. – **Л. скорода**.

АН: *Пз* – 1, 2, 3; *Пю* – 4, 5, 6; *Сб* – 7, 8; *Сс* – 9, 10. **ПР:** *Пв* – 11, 12; *Пс* – 13, 14; *Нб* – 15, 16; *Нс* – 18; +*Нн* – 19. – **2n = 16** (Крогулевич, 1968, 1971, 1978; Фризен, 1985, 1991а).

Примечание. Для *Нн* вид приведен по данным картосхемы Фл. Сиб. (1987: 179).

587. **A. senescens** L. 1753, Sp. Pl.: 299. – **Л. стареющий**.

АН: +*Пю* – 5 (окр. г. Иркутска – Юринский, 1908; Виньковская, Зарубин, 2008); *Сб* – 7. **ПР:** *Нб* – 15 (м/у р. Рытая и р. Шартла – Лукичева, 1972; побережье оз. Байкал – Фл. Сиб., 1987; Байк.-Лен. заповед. – Частухина, Степанцова, 2001). – **2n = 32** (Крогулевич, 1978; Фризен, 1986, 1991а), **48** (Беляева, Сипливинский, 1977; Фризен, 1986, 1988).

588. **A. splendens** Willd. ex Schult. et Schult. fil. 1830, in Roem. et Schult., Syst. Veg. 7, 2: 1023. – **Л. блестящий**.