

**ВѢСТНИКЪ**  
**Тифлискаго Ботаническаго Сада.**

---

Выпускъ 14.

1909 г.

---

**MONITEUR**  
**DU JARDIN BOTANIQUE DE TIFLIS.**

---

Livraison 14.

1909.

---

**ТИФЛИСЪ.**

Типографія К. П. Козловскаго. Головинскій просп., № 12.

1909.

# Нѣсколько новыхъ видовъ растеній изъ Закавказья

А. Томинъ.

---

**Iris Medwedewi** sp. n. (Sect. *Oncoscyclus* Baker.)  
Rhizomate brevi repente, caule ad 26 cm. alto unifloro folia anguste linearia falcata superante, spathae valvis lanceolatis acutis acute carinatis herbaceo-membranaceis tubo longioribus, tubo ovario cylindrico longiuscule pedicellato subbreviore, limbi laciniis externis linearibus horizontalibus ungue densissime atropurpureo-villoso margine atropurpureo-venoso in laminam minutam semiorbicularem atro-purpuream apice saepe in mucronem attenuatam rarius retusam ab ungue linea lilacino-rosea percursam dilatato, laciniis internis multo majoribus oblongo-spathulatis apice subretusis margine irregulariter undulato-denticulatis albis dense coeruleo-violaceo-venosis intus valde sulcatis extus valde carinatis basi parce pilosis, stigmatibus laciniis externis brevioribus fuscis margine revolutis brunneo-punctatis apice breviter bilobis, lobis rotundatis, antheris pallide sulphureis. 4.

Habitat in prov. Talysch, districtus Lenkoran prope pagum Kosmalian, ubi a cl. A. Schelkownikovio detecta est.

Общимъ habitus'омъ растеніе очень напоминаетъ *I. paradoxa*, но хорошо отличается отъ него слѣдующими признаками: болѣе короткими наружными долями околоцвѣтника, маленькая пластинка которыхъ очень часто вытянута на концѣ въ остріе; внутренними листочками околоцвѣтника значи-

тельно болѣе узкими, чѣмъ у *I. paradoxa*, и притомъ снаружи почти до самой верхушки сильно-килеватыми, а совнутри глубоко-желобчатыми, бѣлыми съ сине-фіолетовыми жилками. Лопаста столбика у *I. Medwedewi* болѣе узкія съ загнутыми внизъ краями, а у *I. paradoxa* онѣ эллиптическія съ простертыми краями. Цвѣтъ пыльниковъ у того и другого вида также разнится: у *I. Medwedewi* пыльникъ свѣтло-желтый, а у *I. paradoxa* голубой. Въ отношеніи роста растенія также имѣютъ разницу: стебель *I. Medwedewi* немного длиннѣе, чѣмъ у *I. paradoxa*, и все растеніе вслѣдствіе этого гораздо граціознѣе.

Видъ этотъ былъ недавно найденъ въ Талышѣ близъ сел. Космаліанъ неутомимымъ путешественникомъ по Кавказу натуралистомъ А. Б. Шелковниковымъ.

Описывая это растеніе, въ первый разъ зацвѣтшее въ Тифлисскомъ Ботаническомъ Саду, я съ особымъ удовольствіемъ называю его въ честь Я. С. Медвѣдева, много потрудившагося на пользу нашего Сада.

***Iris Carthaliniae*** sp. n. (Sect. *Aragon* Baker.) Rhizomate crasso repente, caule elato ad 85 cm. alto subcompresso 4—5-floro, spathis approximatis lanceolato-navicularibus carinatis herbaceis acutis, foliis ensiformibus ad 18 mm. latis radicalibus caulem superantibus, caulinis abbreviatis, ovario cylindrico-oblongo sexangulati apice in rostrum longum attenuato pedicello subaequilongo suffulto, perigonii tubo cylindrico-obconico ovario  $2\frac{1}{2}$ -plo breviorе, limbi azurei saturate-venosi laciniarum exteriorum lamina elliptica apice acute-retusa in unguem ea  $1\frac{1}{2}$ -plo longiorem lanceolato-linearem fere linearem basi subdilatatam linea media lutescente notatam abrupte attenuata, laciniis internis erectis oblanceolatis profunde acute retusis in unguem angustum sensim attenuatis; stigmatibus unguibus laciniarum externarum subbrevioribus; capsula glau-

ca sexangulari longe rostrata angulis binatim approximatis 4.  
Habitat in humidis prope Mzchet.

Растение это уже несколько лѣтъ культивируется въ Кавказскомъ отдѣлѣ Тифлискаго Ботаническаго Сада и было опредѣлено мною раньше съ большой натяжкой, какъ *I. notha* М.В. Въ настоящее время, приготовляя для „Опредѣлителя“ дихотомическую таблицу видовъ *Iris*, мнѣ пришлось вновь пересмотрѣть всю живую коллекцію культивирующихся у насъ кавказскихъ *Iris*'овъ, а также гербарный матеріалъ нашего Сада и Кавказскаго Музея; я убѣдился, что имѣю дѣло съ другимъ видомъ, который значительно разнится отъ *I. notha* М.В.

Отличіе этого новаго вида отъ *I. notha* сказывается въ слѣдующемъ: въ величинѣ и формѣ пластинки наружныхъ долей, которая значительно короче ноготка и вмѣстѣ съ послѣднимъ направлена горизонтально, а не внизъ, какъ у *I. notha*; обратно-ланцетной, а не продолговатой пластинкой внутреннихъ долей и наконецъ болѣе широкими листьями. Околоцвѣтникъ у *I. Carthaliniae* небесно-голубой съ темными синими жилками и узкой желтоватой срединной линіей у ноготка. Наружныя доли околоцвѣтника направлены горизонтально, а внутреннія торчатъ вверхъ; пластинка наружныхъ долей эллиптическая на верхушкѣ съ глубокой острой выемкой, переходящая сразу въ линейно-ланцетный или скорѣе линейный, книзу немного расширяющійся, ноготокъ; внутреннія доли обратно-ланцетныя выемчатая, постепенно суженныя въ узкій ноготокъ. Лопасті столбика немного короче ноготка наружныхъ долей. Прицвѣтныя влагалища зеленая, кожистыя, острыя почти безъ бѣлыхъ перепончатыхъ краевъ. Коробочка овально-цилиндрическая, оттянута въ длинный носикъ. Листья линейно-мечевидныя до 18 мм. ширины, прикорневые чаще всего превышаютъ немного сплюснутый стебель, который достигаетъ до 85 см. высоты. Растение это встрѣ-

чается во Мцхетѣ и, повидимому, еще и въ Горійскомъ уѣздѣ, Тифлисской губ.

***Iris musulmanica*** sp. n. (Sect. *Apogon* Baker.) Rhizomate crasso repente, caule elato ad 50—60 cm. alto subcompresso, spathas alternas approximatas edente, foliis linearibus ad 13 mm. latis caulem subaequantibus; spathae valvis herbaceis acutis margine et apice late albo-membranaceis; limbi caerulescenti vel ochroleuci; lamina laciniarum exteriorum elliptico-orbiculata non retusa reflexa basi lutescenti in unguem lanceolatum basi valde angustatum abrupte attenuata, laciniis internis obovatis retusis in unguem sensim angustatis, perigonii tubo ovario sexangulari longe rostrato  $2\frac{1}{2}$ —3-plo brevior; stigmatibus ungues laciniarum externarum aequantibus; capsula oblongo-cylindracea longe rostrata sexangulari, angulis binatim approximatis. 4.

Habitat in humidis salsis prov. Elisabethpol, distr. Areschensis prope Nametabad-nour; in provincia Erivan, distr. Nachiczevan in salsis humidis prope stationem Davalu. (In herbariis caucasicis saepe sub. *I. halophila* Pall.).

Видъ этотъ встрѣчается всюду въ Восточномъ и Южномъ Закавказьѣ на мокрыхъ солонцахъ и на солонцеватыхъ болотахъ. Въ кавказскихъ гербаріяхъ его часто можно видѣть определеннымъ, какъ *I. halophila* Pall. Вѣрноопределенныхъ гербарныхъ экземпляровъ *I. halophila* я до сихъ поръ не видѣлъ и потому могу судить о *I. halophila* только по описанію изъ діагнозовъ. Судя по описанію Boissier Fl. Orient. V. p. 129. и Шмальгаузена Фл. Ср. Росс. стр. 148. у *I. halophila* Pall. (*I. Guldenstädtiana* Ledeb.) трубка околоцвѣтника равняется завязи; пластинка у наружныхъ долей околоцвѣтника овальная узкая, переходящая въ продолговато-линейный ноготокъ. У описываемой *I. musulmanica* mihi трубка околоцвѣтника въ  $2\frac{1}{2}$ —3 раза короче продолго-

ватой, оттянутой въ длинный носикъ, завязи; пластинка наружныхъ долей околоцвѣтника округло-эллиптическая или почти округлая безъ выемки на верхушкѣ, сразу переходящая въ ланцетный, у самаго основанія сильно суженный, ноготокъ; внутреннія доли околоцвѣтника обратно-овальныя на верхушкѣ съ выемкой, постепенно суживающіяся въ узкій ноготокъ. Лопастн столбика по длинѣ равны ноготку наружныхъ долей околоцвѣтника. Что касается окраски околоцвѣтника, то она очень варьируетъ отъ бѣловато-желтоватой до голубой съ желтоватыми оттѣнками. Стебель до 50—60 см. высоты со многими цвѣтками, заключенными въ сближенныя травянистыя ланцетныя влагалища съ широкими бѣло-перепончатыми краями. Описаніе этой формы я даю на основаніи живыхъ экземпляровъ, привезенныхъ изъ Давалу Эриванской губ. и культивирующихся у насъ въ Ботаническомъ Саду, а также и по артистически засушеннымъ гербарнымъ экземплярамъ А. Б. Шелковникова, собраннымъ имъ у Наметабадскаго ноура въ Арешскомъ уѣздѣ Елисаветпольской губ.

**Tulipa Schmidtii** sp. n. (Sect. *Leiostemon* es Boiss. Fl. Or. V. p. 191.) Bulbo magno rotundo 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm. alto et 5 cm. lato tunicis intus dense lanato-pilosis obsito, caule elato cum pedunculo glaberrimo, foliis 6—10 approximatis glaucis omnibus valde obtuse carinatis margine ciliatis, inferioribus oblongis vel oblongo-lanceolatis, superioribus lineari-lanceolatis et linearibus perigonio coccineo erecto magno ad 8—9 cm. longo, perigonii phyllis exterioribus late-oblongis attenuato-acuminatis, interioribus obovatis obtusis plus minus longe mucronatis omnibus basi macula late-rhomboidea fere obovata magna nigra flavido-cincta apice emarginata vel subtridentata notatis, staminibus perigonio 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—3-plo brevioribus, filamentis glabris atro-purpureis anthera duplo longioribus, ovario conico-trigono apice cum stigmatibus intense coccineo 2.

Habitat ad pagum Eschachtschi prov. Baku, distr. Lenkoran, ubi clarissimis A. N. Kaznakovio et A. B. Schelkovnikovio detecta est.

Отъ всѣхъ близкихъ видовъ *Tulipa* на Кавказѣ отличается очень высокимъ ростомъ большимъ числомъ листьевъ, которыхъ бываетъ отъ 6—10, и болѣе крупными цвѣтками. Луковица крупная круглая  $4\frac{1}{2}$  см. въ длину и 5 см. въ ширину съ густо-шерстистыми на внутренней сторонѣ влагалищами. Листья сизые со спинки съ тупымъ выдающимся килемъ желобчатые, по краямъ рѣсничатые, нижніе продолговато-ланцетные, верхніе линейно-ланцетные или линейные. Околоцвѣтникъ ярко-пунцовый прямостоячій колокольчатый, его листочки наружные широко-продолговатые на верхушкѣ оттянутые, очень острые, внутренніе обратно-овальные тупые на концѣ съ болѣе или менѣе длиннымъ остриемъ; у основанія всѣ листочки имѣютъ широко-ромбическое на верхушкѣ выемчатое или съ тремя зубцами черное пятно, окруженное желтой полоской. Тычинки въ  $2\frac{1}{2}$ —3 раза короче околоцвѣтника, тычиночныя нити голыя черно-пурпуровыя въ два раза длиннѣе пыльниковъ. Завязь коническо-трехгранная на верхушкѣ вмѣстѣ съ рыльцами ярко-пунцовая.

Видъ этотъ былъ найденъ А. Б. Шелковниковымъ и А. Н. Казнаковымъ въ Талышѣ близъ сел. Эшакчи Ленкоранскаго уѣзда.

**Allium firmotunicatum** sp. n. (Porrum Tourn., Boiss. Fl. Or. V. p. 229). Bulbi rotundato-ovati bulbiferi tunicis fuscis coriaceis firmis apice in fibras parallelas plus minus solutis, bulbillorum fuscorum semiovatorum tunicis firmis verruculosus, scapo elato ad 60 cm. alto ad medium foliato folia fistulosa cylindracea striata ad nervos sub lente denticulato-scabrida ad anthesin evanida superante; spatha cuspidata cito decidua, umbellae hemisphaericae interdum fere globosae pedi-

cellis rubris basi bracteolatis externis flore 2—2½-plo longioribus, internis 4—5-plo longioribus, perigonii trigono-campanulati rubro-vinei phyllis conniventibus ovato-oblongis obtusis ad 3½ mm. longis externis valde carinatis carina saturate colorata verruculosa, filamentis exsertis dilatatis basi subciliolatis internis tricuspидatis longioribus cusпиде antherifera lateralibus ⅓ breviorе, stylo rubro post anthesin exserto. 2.

Habitat in prov. Karabagh, in steppa Mil, ubi a cl. A. Schelkownikovio detectum est.

Луковицы были привезены въ Тифлисскій Ботаническій Садъ изъ Мильской степи А. Б. Шелковниковымъ; растение зацвѣло въ кавказскомъ отдѣлѣ Тифлисскаго Ботаническаго Сада 5. VI. 09 года.

Луковица округло-овальная съ кожистыми твердыми влагалищами, между которыми имѣются желтовато-бурая съ одной стороны плоскія луковички съ такими же твердыми влагалищами, которыя подъ лупой кажутся покрытыми мелкими бугорками. Стебель высокій до 60 см. высоты, до середины облиственный; листья полые цилиндрическіе бороздчатые вдоль бороздокъ зубчато-шероховатые передъ цвѣтеніемъ увядающіе; влагалища листьевъ также вдоль нервовъ зубчато-шероховатые. Покрывало съ длиннымъ остриемъ, скоро опадающее. Зонтикъ соцвѣтія полушаровидный или иногда почти шаровидный; цвѣтоножки винно-красныя у основанія съ ланцетными прицвѣтничками, наружныя короче въ 2—2½ раза длиннѣ цвѣтка, внутреннія въ 4—5 разъ длиннѣ цвѣтка. Околоцвѣтникъ трехгранно-колокольчатый винно-краснаго цвѣта съ малиновымъ оттѣнкомъ; листочки околоцвѣтника сходящіяся овально-продолговатые тупые до 3½ мм. длины, наружныя съ бородавчатымъ, болѣе интенсивно окрашеннымъ килемъ. Тычиночныя нити расширенныя, у основанія по краю съ рѣсничками, выдаются изъ околоцвѣтника, внутреннія длин-



нѣе наружныхъ съ тремя зубцами, изъ которыхъ средній, несущій пыльникъ, на  $\frac{1}{8}$  короче боковыхъ. Столбикъ красный къ концу цвѣтенія выдается изъ околоцвѣтника.

**Allium fuscoviolaceum** sp. n. (Porrum Tourn., Boiss. Fl. Or. V. p. 229). Bulbi mediocri rotundi tunicis albis membranaceis, scapo elato ad 60 см. alto ad tertiam partem foliato folia fistulosa apice valde attenuata supra canaliculata ad marginem canaliculi serrulato-scabrida superante; spathae bifidae cuspidatae valvis ellipticis reflexis umbella brevioribus, umbellae globosae multiflorae densae pedicellis apice papillosis externis flore duplo longioribus, internis 4-plo longioribus; perigonii ad 4 mm. longi fusco-vineo-purpurei phyllis conniventibus oblongis obtusis externis carinatis laevibus, filamentis omnibus exsertis, internis tricuspidatis, cuspidе antherifera lateralibus saepius subduplo longiore vel. subaequante; stylo rubro exserto. 2.

Habitat in prov. Kars, in monte Askjar-dagh prope Sarykamysch ubi a cl. S. Michailowskyo detectum est.

Зонтикъ и околоцвѣтникъ по окраскѣ и формѣ такіе же, какъ у *Allium atroviolaceum* Boiss., отъ котораго отличается полыми, полуцилиндрическими сверху слегка желобчатыми и по краю желобка пильчато-шероховатыми листьями, а также и строеніемъ внутреннихъ тычиночныхъ нитей, у которыхъ средній зубецъ, несущій пыльникъ, часто бываетъ въ  $1\frac{1}{2}$  или 2 раза длиннѣе боковыхъ зубцовъ или равенъ имъ. Помимо этого верхняя часть цвѣтоножки непосредственно подъ цвѣткомъ усажена ворсинками. Растеніе это въ 1904 году было найдено С. И. Михайловскимъ въ Карсской обл. близъ Сарыкамыша на горѣ Аскьяръ-дагъ и культивировалось въ Кавказскомъ отдѣлѣ Тифлискаго Ботаническаго Сада, гдѣ и зацвѣло въ первый разъ 30 мая 1909 года.

**Allium kossoricum** sp. n. (Haplostemon § Codonoprasa Boiss. Fl. Or. V. p. 230.) Bulbi ovato-oblongi tuni

cis nigrescentibus in fibras parallelas solutis, scapo humili tereti tenui infra medium foliato, foliis cylindraceo-filiformibus tenuissimis glabris, umbellae pauciflorae fastigiatae pedicellis tenuissimis flore 5—6-plo longioribus, spathae valvis binis lanceolatis subulato-attenuatis umbella brevioribus, perigonii  $3\frac{1}{2}$  mm. longi breviter hemisphaerici phyllis ellipticis albido-viridibus lilacino-maculatis obtusis vel apice obtuse-apiculatis, carina viridi percursis, filamentis glabris anguste-subulatis intense-violaceis perigonio duplo longioribus antheris flavis, stylo longe exserto apice clavato post anthesin filamenta multo superante, ovario triloculari depresso loculis rotundatis dorso profunde sulcatis. 2.

Habitat in prov. Karss, distr. Olty prope pagum Kossor ubi legit cl. E. Koenig.

Видъ, близкій къ *Allium stamineum* Boiss., отъ котораго отличается болѣе рѣдкимъ зонтикомъ, цвѣтомъ околоцвѣтника и тычиночныхъ нитей и болѣе тонкими листьями.

**Allium karsianum** sp. n. (Haplostemon § Codonoprasa Boiss. Fl. Or. V. p. 230.) Bulbi ovato-rotundi tunicis externis membranaceis nigro-griseis basi in fibras parallelas solutis, internis albis pergamaceis, scapo gracili tereti supra medium foliato, foliis semiteretibus ad 2— $2\frac{1}{2}$  mm. latis tenuiter striatis ad margines et ad nervos (sub lente) scabridis scapo brevioribus superiore umbellam superante, spatuae valvis binis lanceolatis longe filiforme-caudatis umbellam subduplo superantibus, umbellae 25—30-florae pedicellis inaequalibus tenuibus perigonio pluries longioribus, perigonii pallide rosei fere albidi campanulati ad 8 mm. longi phyllis late-lineari-oblongis obtusissimis carinatis carina virida, emarcidis roseis, filamentis subulatis perigonio aequilongis, antheris sulphureis, stylo staminibus brevioribus post anthesin non exserto, ovario triloculari sexangulari. 2.

Habitat. in prov. et districtus Kars inter Kurch-kilissa et Chaskei, ubi legit cl. E. Koenig. 13. VI. 08. cum flor.

Луковица округло-овальная съ черновато-сѣрыми наружными и бѣлыми внутренними влагалищами. Стебель до 15—20 см. высоты круглый, тонкій выше середины облиственный. Листья полуцилиндрическіе съ тонкими бороздками до 2—2½ мм. ширины по краямъ и вдоль бороздокъ (нервовъ) подъ лупой шероховатые, нижніе короче стебля, а верхній листъ немного превышаетъ зонтикъ соцвѣтія. Покрывало съ двумя ланцетными долями, вытянутыми въ длинныя нитевидныя остроконечія, превышающія почти въ два раза зонтикъ соцвѣтія. Цвѣтоножки неравныя, во много разъ превышающія цвѣтокъ. Околоцвѣтникъ въ живомъ состояніи блѣдно-розоватый почти бѣлый, въ сухомъ видѣ свѣтло-розовый, колокольчатый до 8 мм. длины, его доли линейно-продолговатыя очень тупыя съ зеленымъ килемъ со спинки. Тычиночныя нити шиловидныя равны околоцвѣтнику; пыльники сѣрно-желтые. Столбикъ короче тычинокъ и не выставляется изъ околоцвѣтника даже послѣ цвѣтенія.

Видъ этотъ найденъ Е. Г. Кёнигомъ между Кырх-килиса и Хасъ-кей въ Ольгинскомъ округѣ, Карсской области.

**Allium incisum** sp. n. (Haplostemon § Codonoprasa Boiss. Fl. Or. V. p. 230.). Bulbi ovati tunicis fusco-griseis in fibras subreticulatas solutis ad basin caulis *longe productis* scapo gracili tereti glaberrimo ad 20—30 cm. longo usque ad medium foliato folia filiformia semiteretia anguste canaliculata nervosa ad margines et nervos aspero-pilosa superante, vaginis foliorum longis striatis ad strias aspero-pilosis, spatha *univalvi* ovato-oblonga acuminata basi tubulosa persistente umbella subbreviore, umbellae fastigiatae 12—15-florae pedicellis valde inaequalibus flore pluries longioribus basi

bracteolatis, perigonii dilutissime rosei fere albi tubuloso-campanulati ad 7 mm. longi phyllis *elliptico-oblongis obtusis* externis *integris* parte superiore, marginibus revolutis apice reflexis, *internis erectis margine* profunde *fimbriato-incisis*, filamentis lutescentibus inter se liberis inaequalibus externis e basi lanceolata subulatis perigonio duplo brevioribus internis ima basi interdum denticulo auctis late lanceolatis concavis apice subulatis perigonio tertia parte brevioribus, antheris ellipticis in vivo albidis, ovario *ovato obtuse-trigono*, stylo ovario triplo breviorе. 2.

Habitat in provincia Kars prope urbem Olty ad initium juli cum floribus, legit cl. E. Koenig.

Видъ этотъ очень близокъ *Allium lacerum* Freyn (см. Plantae novae Orientales pag. 378. in Oesterr. botan. Zeitschrift) отъ котораго отличается наружными цѣльнокрайними листочками околоцвѣтника и притомъ тупыми а не острыми, однолистнымъ покрываломъ, желтыми тычиночными нитями, изъ которыхъ внутреннія болѣе длинныя и наконецъ розовато-бѣловатыми пыльниками и пыльцей. Отъ другого близкаго вида *A. callidictyon* С. А. Меу. отличается также одностворчатымъ, остающимся прицвѣтнымъ покрываломъ, блѣдной окраской околоцвѣтника и его бахромчато-надрѣзанными внутренними листочками, а также и свободными, не сросшимися другъ съ другомъ, тычиночными нитями.

*Allium* sp. (*Nauplostemon* § *Codonoprasa* Boiss. Fl. Or. V. p. 230). Bulbi ovato-oblongi tunicis fuscis eximie crasse reticulato-fibrosis ad basin caulis productis, scapo ad 25 cm. alto tereti gracili ad medium foliato folia semiteretia filiformia circinata striata ad strias aspero-pilosa superante, vaginis striatis dense aspero-pilosis, spatha (ignota), umbellae fastigiatae pauciflorae pedicellis valde inaequalibus basi bracteolatis flore pluries longioribus, perigonii tubuloso-campanulati dilute rosei

phyllis obtusis externis elliptico-oblongis integris, internis lineari-oblongis apice brevissime serrulatis dorso omnibus nervo fusco-viridi percursis, filamentis albis perigonio tertia parte brevioribus externis basi subdilata subulatis, internis late lanceolatis concavis apice valde angustatis; antheris ellipticis pallide sulphureis. 2.

Habitat ad fines Persiae, ripa sinistra Araxis prope stationem militarem Besoglyban.

Species valde proxima *Allio inciso* mihi ab eo differt perigonii phyllis internis apice brevissime serrulatis nec profunde fimbriato-incisis. (An var. *araxanum Allii incisi?*)

Видъ этотъ очень близокъ къ *A. incisum* m., отъ котораго отличается внутренними листочками околоцвѣтника на верхушкѣ мелко-зубчатыми, а не глубоко-бахромчато-надрѣзанными. Растеніе это доставлено было мнѣ съ опавшимъ цвѣточнымъ покрываломъ, а потому мнѣ неизвѣстно было-ли покрывало одностворчатымъ или же съ двумя створками.

**Allium charaulicum** sp. n. (Haplostemon § Codonoprasa Boiss. Fl. Orient. V. p. 230). Bulbis aggregatis ovatis tunicis griseis interdum violaceo-suffusis membranaceis, scapo humili ad 15—20 cm. alto glabro ad medium folioso, foliis scapo brevioribus filiformibus semiteretibus canaliculatis et striatis ad strias et margines canaliculi denticulato-scabridis, umbellae 15—25-florae ante anthesin diffusae dein comosae pedicellis virgineis erectis, pedicellis sub anthesi reflexis flore quadruplo longioribus basi bracteolatis, spathae valvis binis anguste-lanceolatis longe rostratis altera umbellam 2—3-plo superante, perigonii obconico-campanulati ad  $5\frac{1}{2}$  mm. longi phyllis ellipticis obtuse-apiculatis in vivo albidis rubescenti-striatis obtuse carinatis carina viridi-rubescente, filamentis subulatis basi perigonio adnatis perigonio  $1\frac{1}{2}$ -plo longioribus,

antheris sulphureis, ovario sexangulari, angulis aequidistantibus, stylo exserto ovarium subaequante. 2.

Habitat prope pagum Charaul provinciae Batum., districtus Artwin, ubi a cl. E. Kёnigo detectum est.

Это растение найдено Е. Г. Кёнигомъ близъ сел. Харауль Батумской области, Артвинскаго округа. Луковицы овальныя небольшія собраны по нёскольку вмётѣ; влагалища луковиць перепончатая сѣрыя иногда съ лиловымъ оттёнкомъ. Стебель низкій круглый до 15—20 см. высоты, голый. Листья короче стебля полуцилиндрическіе нитевидныя, желобчатые и ребристыя, а вдоль реберъ и краевъ подъ лупой зубчато-шероховатыя. Зонтикъ соцвѣтія содержитъ отъ 15—25 цвѣт-ковъ до цвѣтенія развѣсистый съ вверхъ-торчащими цвѣтоножками, при расцвѣтаніи же какъ бы составленный изъ двухъ зонтиковъ, такъ какъ цвѣтоножки нераспустившихся цвѣтковъ направлены прямо вверхъ, а цвѣтоножки распустившихся цвѣтковъ загнуты дугою внизъ. Цвѣтоножка у распустившихся цвѣтковъ въ 4 раза длиннѣе околоцвѣтника. Прицвѣтное покрывало состоитъ изъ 2 ланцетныхъ створокъ вытянутыхъ въ длинныя острія, изъ которыхъ одинъ въ 2—3 раза превышаетъ зонтикъ. Околоцвѣтникъ обратно-коническо-колокольчатый въ живомъ состояніи жемчужно-бѣловатый съ красноватыми короткими штрихами. Листочки околоцвѣтника эллиптическіе съ короткимъ тупымъ остроконеціемъ и зеленовато-красноватымъ срединнымъ нервомъ. Тычиночныя нити шиловидныя въ  $1\frac{1}{2}$  раза длиннѣе околоцвѣтника, пыльники сѣрно-желтые. Завязь шестигранная съ 6 ребрами; столбикъ по длинѣ равенъ завязи и выставляется изъ вѣнчика.

## **Einige neue Pflanzenarten aus Transkaukasien.**

**A. Fomin.**

### *Résumé*

Unter diesem Titel giebt der Autor die Beschreibung dreier neuer Arten *Iris*, einer Art *Tulipa* und mehrerer Arten *Allium* aus Transkaukasien.

---